

Vado in ipo

Scritto da Geremia Bolli
Venerdì 27 Febbraio 2009 20:39

D : Egregio Professore Bolli,

sono una ragazza di 22 anni e soffro di diabete dall'età di cinque anni, quindi ormai da 17 anni.

Fino a qualche giorno fa facevo le seguenti dosi di insulina, a colazione 5 unità Humulin R e 4 unità Humalog.

Purtroppo ogni tanto vado in ipoglicemia e questo è successo anche lunedì nelle prime ore del mattino,

Martedì sono stata in ospedale a Prato per effettuare un controllo e la dottoressa mi ha consigliato di cambiare terapia.

Cosa ne pensa, e soprattutto, cosa pensa che mi conviene fare? Aumentare la Lantus, oppure aumentare la Humalog?

Le sarei molto grata di una sua risposta in merito.

Grazie e cordiali saluti

F C

R : cara F,

grazie del messaggio, vedo che hai bisogno di aiuto.

Il consiglio di usare Humalog + lantus è buono ma:

-inietta lantus con siringa da 30 U (non con penna) nella parte anteriore cosce alle ore 20 (o 21), la dose di Humalog

il cambio di terapia è semplice, ma se hai problemi vienimi a trovare a Perugia, è meglio parlare a voce

cari saluti

D : Egregio Professore Bolli,

con molto piacere ho letto il suo messaggio che mi porta a farle ulteriore domande.

Come mai mi consiglia di iniettare la Lantus usando la classica siringa e non la penna?

Lei pensa che sia meglio iniettare la Lantus la sera che al mattino? Circa 3 anni fa ho già provato di usa

Mi farebbe piacere sentire il parere di un altro diabetologo e magari parlare anche a voce con lei.

Per ora grazie e cordiali saluti

F C

R : cara F

il discorso è semplice ma non facile da fare via email:

1. la siringa è il modo più sicuro di avere la dose desiderata, in alternativa puoi usare Opticlick (ma non
2. lantus è meglio la sera, la dose va scelta per non mandarti in ipo, se la usi la mattina devi aumentare

cari saluti

Vado in ipo

Scritto da Geremia Bolli
Venerdì 27 Febbraio 2009 20:39

Prof. Geremia B. Bolli
Department of Internal Medicine, Endocrinology
and Metabolism
University of Perugia