

MODY? Tipo 2?

Scritto da Geremia Bolli
Venerdì 27 Febbraio 2009 21:19

D : Gentile professore, approfitto della sua disponibilità per sottoporle una questione

Al mio fidanzato, 30 anni, hanno diagnosticato il diabete di tipo 2 da più di un anno circa. Per l'adolescente
La diminuzione drastica di peso è avvenuta quindi prima dell'inizio delle cure con insulina, e dovendo lui
Attualmente assume 6 di insulina al giorno e pastiglie per il controllo degli zuccheri prima dei due pasti,
A digiuno spesso è soggetto a ipoglicemia.

Oltre agli usuali disturbi che comporta la patologia in se, quali infezioni, a volte manifesta un intenso dolore
Questi sintomi sono normali? la diagnosi di diabete 2 è corretta o potrebbe invece trattarsi di diabete MODY
Le problematiche fisiche si aggiungono a quelle psicologiche, ho notato che il modo di porsi di fronte alla

La ringrazio anticipatamente, cordiali saluti.

L.

R : cara L,

credo che il tuo fidanzato abbia un tipico diabete di tipo 2, forse autoimmune (hai dosato gli anticorpi GAD65)
Comunque:

-il suo pancreas è quasi esaurito, anche se ancora risponde ai farmaci orali (ma non quali)

-il forte dimagrimento indica che ha bisogno di insulina:

a)insulina basale per 24 h, tipo lantus o detemir

b) insulina rapida ai pasti (humalog o novorapid o apidra)

MODY? Tipo 2?

Scritto da Geremia Bolli
Venerdì 27 Febbraio 2009 21:19

-dovrebbe cessare i farmaci orali

-seguire una dieta a 1800-200 Kcal/die in questo modo riacquista 3-5 kg di peso, sta bene, la glicemia s

Se ha problemi in futuro, portalo a Perugia se vuole.

cari saluti

Prof. Geremia B. Bolli
Department of Internal Medicine, Endocrinology
and Metabolism
University of Perugia