

Ipo e poi ... iper

Scritto da Geremia Bolli
Venerdì 27 Febbraio 2009 21:29

D: La mia bambina di 10 anni è affetta da diabete mellito 1 con esordio nel gennaio

Da gennaio a luglio è stato sufficiente somministrarle 1 u di lantus al mattino per mantenere degli ottimi

Da luglio in poi le cose sono peggiorate anche causa malattie intercorrenti (classiche infezioni infantili),

La glicata all'esordio 7.3 - successivo controllo 6.4 – 7.3 - 8.1 (questa ultima effettuata a ridosso di una

Ad oggi siamo arrivati al seguente schema: 5 u di lantus la mattina + 2 rapide (Novorapid) – 3 rapide pr

Con questa terapia i valori della glicemia si sono “abbastanza” stabilizzati .

Negli ultime 48 ore è successa una cosa che non mi spiego e che mi ha trovata impreparata nella gestio

Preciso che in tutte le occasioni e arrivata ai pasti con glicemia comprese tra 100 e 130 e che la rapida c

Mi chiedo perché la bambina ha queste ipo e cosa sbaglio nella correzione delle stesse?

(ho provato con un bicchiere di latte e 2 biscotti alla sera con glicemia 60 arrivando a 172 al risveglio- c

La ringrazio e mi scuso se la terminologia medica è ancora carente ma sono una mamma neofita del “m

Ipo e poi ... iper

Scritto da Geremia Bolli
Venerdì 27 Febbraio 2009 21:29

R : gentile Signora grazie del suo messaggio.

Ci sono aspetti positivi nella sua lettera:

l'età grandicella della bambina, la breve durata del diabete, una buona cura con l'uso di analoghi di insulina

i consigli:

-lantus è meglio usarla solo 1 volta al dì ore 20 (o 21).

La dose è quella che porta la glicemia al mattino fra 90-130 mg/dl partendo da un buon dopo cena

-Continui a usare novorapid alla 1° colazione, merenda, pranzo, merenda pomeriggio e cena, le dosi corrette

Può usare la "Novopen Demi" che dà mezza unità e fare 1,5 invece di 2 U.

in questo modo eviterà l'ipo e l'A1C si abbasserà

cari saluti

Prof. Geremia B. Bolli
Department of Internal Medicine, Endocrinology
and Metabolism
University of Perugia